



Bản Tin Điện Tử TT Mobile Thư Viện Luật

10 Tin đọc nhiều nhất: [Bán nhà ghi giá -](#)

Tim kiếm Off

Trang Chính

Chính trị - Xã Hội
Người Việt xa quê
Thế Giới
Kinh Tế
Giáo Dục - Du Học
Văn Hóa - Giải Trí
Việc làm Online
Nhịp Sống Số
Thể Thao
Nhịp Sống Trẻ
Tình yêu - Lối sống
Pháp Luật
Sức Khỏe
Giới tính
Phòng mạch Online
Khoa Học
Du Lịch
Bạn Đọc Viết
Hồ sơ - Tư liệu

RSS

Tự Hào Việt Nam

Tủ Sách Tuổi Trẻ

Media Online

Thiệp Online

Tìm địa điểm

Thể thao

Việc làm Online

Tuyển Sinh

Giao lưu trực tuyến

Đóng góp hảo tâm

Thông tin tòa soạn

online@tuoitre.com.vn
(08) 997.1010
0918.033.133



Sức Khỏe

Thứ Hai, 05/09/2005, 13:00 (GMT+7)

Kiểm tra tìm giúp tránh 1/10 ca đột tử

TTO - Có thể tránh được 1 trong số 10 ca đột tử ở trẻ sơ sinh bằng cách khám tim và điều trị thích hợp, theo các nhà nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện nguyên nhân chính dẫn đến đột tử ở trẻ sơ sinh là do các vấn đề về tim, một chứng bệnh được gọi là hội chứng Q-T kéo dài, khiến cho tim nghỉ quá lâu.



Kiểm tra thường xuyên tim trẻ để tránh các nguy cơ về tim có thể xảy ra

Một nghiên cứu gần đây công bố tại hội nghị thường niên của Hội tim mạch châu Âu tại Thụy Điển cho thấy có ít nhất 8,4% các ca đột tử ở trẻ sơ sinh là do có sự đột biến gen gây ra hội chứng Q-T kéo dài và có liên quan đến chứng loạn nhịp tim. Tuy nhiên, giáo sư Peter Schwartz tại Trường ĐH Pavia (Ý) và các đồng nghiệp từ Trường ĐH Oslo cho biết con số đó trên thực tế lại cao hơn, có thể từ 10-12%.

Ngoài nguyên nhân trên, các nghiên cứu trước đó cũng cho thấy các vấn đề ở dạ dày, ở hệ thần kinh hô hấp và sự bất thường trong quá trình trao đổi chất ở gan cũng có thể dẫn đến đột tử ở trẻ sơ sinh.

Các nhà nghiên cứu khuyên nên đo điện tim cho trẻ dưới 1 tuổi. Việc khám và điều trị tim hợp lý cho trẻ sơ sinh có thể giúp giảm 10% nguy cơ đột tử.

T.VY (Theo Reuters)

Bản in Phản hồi Gửi tới Về đầu trang Chọn ngày

- Đau thắt lưng và những biến chứng - (05/09)
- Vấn thả nổi giá thuốc bán lẻ - (05/09)
- 10 triệu người Thái dư cân - (05/09)
- UNICEF: giáo dục để ngăn ngừa AIDS ở trẻ em - (04/09)
- Ngừng thở khi ngủ: dấu hiệu của bệnh tim mạch sớm - (04/09)
- Tác dụng của nụ cười - (04/09)
- Những điều cần biết trong trường hợp khẩn cấp - (04/09)
- Thành phố của những người sống lâu - (03/09)
- Anh: tỷ lệ vô sinh tăng - (03/09)
- Lạc phòng ngừa bệnh tim mạch và tiểu đường - (02/09)

Ấn Độ: hai bé gái song sinh dính liền phần đầu



TTO - Trong ảnh là hai bé gái song sinh dính liền phần đầu Vani (trái) và Veena, 4 tuổi, tại một bệnh viện ở thành phố Hyderabad (miền nam Ấn Độ). Bố mẹ hai em đang tìm kiếm một bệnh viện có thể giải phẫu tách rời thành công hai bé.

(Xinhua/Reuters)

[Xem tiếp...](#)

CÙNG GIA CẨM

SỐT XUẤT HUYẾT

VIÊM NÃO CẤP

KHÁM CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ

VACCINE KÉM CHẤT LƯỢNG

Phòng mạch Online



Bị rối loạn lipid máu, có thể dùng sữa?

Giới tính



Vô sinh nam ngày càng tăng

Mẹo vặt cho cuộc sống



Mẹo vặt để giảm 100 calo mỗi ngày

Những điều cần biết



Chuyện ăn của con trẻ

Sức khỏe mẹ và bé



Đỡ thoải mái khi mang thai

Cảnh Báo



Chết vì uống "thần dược" ngoại



Số lượng trẻ rối loạn thần kinh đang tăng



Cảnh báo khi ăn rau sống



Xuất hiện bệnh lao siêu kháng thuốc



Trẻ mắc bệnh lồng ruột tăng cao