



Tiện ích site

Giới thiệu Bệnh viện

Tra cứu bệnh án

Đăng ký khám bệnh

Khám sức khỏe

Khách hàng

Viện phí

Chuyên mục y

Tin y-dược học

Lâm sàng

Nha khoa

Sân phụ khoa

Các chuyên khoa

Bệnh tim mạch

Điều dưỡng

Dinh dưỡng

Xét nghiệm

Dịch bệnh

Ung thư

Y học cổ truyền

Y học chứng cứ

Nghiên cứu

Chuyên mục khác

Tim kiếm

Suy giảm

Khám phá

1001 chuyện bí ẩn

Thời trang

Thể thao

Âm Nhạc

Tiểu lâm quán

Thư viện ảnh

Sức khỏe của bạn

TU DIỆN VDICT

Tra theo từ điển:

Tin tức » Dược lâm sàng

24.01.2010 06:42

WARFARIN CẮT NGUY CƠ NGHIỀN MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHỈ

04.02.2009 23:49

Tại Việt-nam, warfarin và coumadin chưa được dùng nhiều cho bệnh nhân rung nhĩ, có lẽ là phải theo dõi thời gian prothrombin nhiều lần, nên bác sĩ ngại. Nhưng sau đây là một nghiên cứu chứng minh dùng warfarin có lợi cho bệnh nhân rung nhĩ: Ở bệnh nhân rung nhĩ không phải do lá van, điều trị bằng warfarin không những giảm nguy cơ đột quỵ mà còn giảm nguy cơ nghẽn mạch toàn thân ở tứ chi và nội tạng.

Trong khi giá trị của warfarin để ngừa đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ được ghi nhận nhiều trong y văn, tác dụng khả dĩ của thuốc chống đông máu lên nguy cơ nghẽn mạch toàn thân chưa được xem xét, theo lời các nhà nghiên cứu tại một đại học y khoa Đan-mạch, trong số báo Heart tháng 12/08. Họ thực hiện phân tích meta 15 nghiên cứu nổi bật xuất bản trong khoảng tháng 1/89 đến tháng 11/07, gồm 16 058 bệnh nhân với 128 sự cố nghẽn mạch và 371 sự cố xuất huyết lớn.

Họ tìm thấy chứng cứ mạnh warfarin vượt trội so với thuốc chống tiểu cầu như aspirin và clopidogrel để ngừa nghẽn mạch toàn thân ở bệnh nhân rung nhĩ không phải là van.

So với thuốc chống tiểu cầu, điều trị bằng warfarin giảm nguy cơ nghẽn mạch toàn thân 50% mà không tăng nguy cơ xuất huyết lớn.

Warfarin so với giả được giảm nguy cơ 71% nhưng có nguy cơ xuất huyết cao hơn.

Kết quả so sánh warfarin với liều thấp warfarin hay liều thấp warfarin + aspirin chưa thể cho kết luận, vì sự cố xảy ra ít ở nhóm dùng warfarin so với nhóm dùng liều thấp warfarin và kết hợp liều thấp warfarin + aspirin. Cũng xin nhắc lại là warfarin dùng để ngừa đột quỵ bệnh nhân rung nhĩ, phải có INR trong khoảng từ 2.0 đến 3.0, nếu thấp hơn thuốc không có hiệu quả và cao hơn dễ sinh xuất huyết. Bệnh nhân cần phải đi thử mức chống đông mỗi tháng 1 lần.

Dược sĩ Lê-văn-Nhân

(Theo yduocngaynay.com)



NHỮNG BÀI TIN KHÁC:

- » THÊM THÔNG TIN VỀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THIẾU MÁU Ở NGƯỜI BỆNH THẬN [15.01.2010 09:02]
- » THUỐC KHÁNG ESTROGEN CÓ THỂ GIÚP CHỐNG TỬ VONG DO UNG THƯ PHỔI [13.01.2010 14:48]
- » CẢNH BÁO VỀ THUỐC CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID DICLOFENAC [19.12.2009 14:43]
- » HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯỜNG DƯƠNG [15.12.2009 10:35]
- » Bạch Quả Không Ngừa Được Nhồi Máu Cơ Tim và Đột Quỵ ở người cao tuổi [08.12.2009 09:08]
- » VITAMINE D, SỰ QUAN TÂM TRỞ LẠI. [02.12.2009 06:51]
- » NGHI VẤN VỀ VIỆC DÙNG ASPIRIN CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG [30.11.2009 10:55]
- » MỘT SỐ TIN VỀ THUỐC [19.11.2009 06:45]
- » Hướng Dẫn Kết Hợp Colchicin với Thuốc Chẹn Kênh Calcium [12.11.2009 10:51]
- » Hướng Dẫn Mới Của Hội Bệnh Cao Huyết Áp Âu Châu [09.11.2009 08:03]
- » NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG DƯỢC [05.11.2009 14:24]
- » GLUCOSAMIN KHÔNG NGẮN MẮT SỤN ĐẦU GỐI [02.11.2009 16:51]
- » Statins và cảm cúm [01.11.2009 15:14]
- » Thuốc Chủng Ngừa và Trị Ung Thư [19.10.2009 08:33]
- » Hướng Dẫn Theo Dõi Điều Trị Nhiễm Staph. aureus Bằng Vancomycin [15.10.2009 16:15]

Đăng nhập/Đăng ký

Bí danh
 Mật khẩu
 Ghi nhớ ☐

Cắm ghép răng



Thành viên có mặt

Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng: 002
 Hits: 001359097

Websites có ích

Một số website hay

Liên kết site



Liên kết-Quảng cáo